

# サンケイ化学 農薬登録情報

## キルパー40

登録番号：農林水産省登録 第24080号  
有効成分：カーバムナトリウム塩・・・42.0%  
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

### 新規登録取得のお知らせ

弊社取り扱いの総合土壌燻蒸剤『キルパー40』が平成30年5月16日付けで下記の通り新規登録取得いたしました。

#### 【新規登録の理由】

従来のキルパー40(第19680号)は有効成分量40.0%を最低保証値で表示していましたが、今後は実際の仕込値(中央管理値)を表示することとなり、これに伴い、有効成分量表示を42.0%とするため、新規の登録となりました。

#### 【従来の40%表示品との違い】

今回の42%表示キルパー40と従来の40%表示品との含有有効成分量、物性、品質は全く変更ありません。登録番号と成分含有量の表示変更です。

#### 【適用内容】

従来の40%表示品に「なら類(枯損木)」の適用が追加され、下記の通りとなります。

#### <適用表>

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸期間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カーバムナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
まつ(伐倒木)	林内空地	マツノダマシキリ幼虫、マツノサイゼンチュウ	被覆内容積1m <sup>3</sup> 当り原液375~750mL	7日間以上	—	1回	加害された伐倒木を集積し、所定薬量を散布し、直ちにビニールシート等で密閉し所定期間くん蒸する。	1回
ヤシ類(伐倒木)	—	ヤシオオオサゾウムシ成虫	被覆内容積1m <sup>3</sup> 当り原液750mL	20日間以上				
なら類(伐倒木)		カシノナガキクイムシ	1樹当り胸高直径(cm)×原液8mL	14日間以上	成虫羽化脱出前	千鳥状に開けた穴に規定量の原液を注入し、くん蒸する。		

#### 【製造開始時期】

42%表示品の製造・出荷時期は、8月頃を予定しています。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地  
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル3F  
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1  
大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島4丁目5-1 新栄ビル内

TEL: (099) 268-7588  
TEL: (03) 3845-7951  
TEL: (048) 551-2122  
TEL: (06) 6305-5871