

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイ スミチオン乳剤

MEP 乳剤

登録番号：農林水産省登録第 5052 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：MEP・・・50.0%

毒性：普通物（毒物・劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録商品「サンケイスミチオン乳剤」が平成 30 年 5 月 30 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」の希釈倍数「1000 倍」、使用方法「散布」に適用病害虫名「アワヨトウ」を追加する。
- ・作物名「だいず」の希釈倍数「1000 倍」に適用病害虫名「マメハンミョウ」を追加する。
- ・作物名「らっきょう」に適用病害虫名「ネダニ類」を追加する。
- ・作物名「らっきょう」の適用病害虫名「アザミウマ類」の使用時期「収穫 14 日前まで」を「収穫 7 日前まで」に変更する。
- ・作物名「らっきょう」の MEP を含む農薬の総使用回数「2 回以内」を「3 回以内（植付前は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。
- ・作物名「稲」、「麦類（大麦、小麦を除く）」、「大麦」「小麦」「みかん」「だいず」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

次ページに記載します。

#### 【注意事項の変更について】

使用上の注意事項の「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

使用上の注意事項などについては製品に貼付されているラベルを参照してください。



## サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数		
稲	ニカメイチュウ第1世代	1000~2000倍	60~150 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)		
	ニカメイチュウ第2世代	800~1000倍							
	サンカメイチュウ第3世代	1000倍							
	ヒメビウンカ								
	カメムシ類								
	イネツトムシ								
	イネシンガレセンチュウ								
	イネドロオイムシ								
	アブラムシ類								
	アワヨトウ	1000~2000倍							
イネハモグリバエ	2500倍								
イネヒメハモグリバエ	2000~4000倍								
フタオビコヤガ	1000倍	-	は種前	1回	6~72時間浸漬				
イネシンガレセンチュウ	100倍				専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理または塗沫処理				
稲	ニカメイチュウ	30倍	3L/10a	収穫21日前まで	2回以内	空中散布			
	ヒメビウンカ								
	カメムシ類								
イネハモグリバエ	8倍	800mL/10a	無人航空機による散布						
イネヒメハモグリバエ				300倍	25L/10a	散布			
麦類 (大麦、小麦を除く)	アブラムシ類	1000倍	60~150 L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回		
	アワヨトウ					30倍		3L/10a	空中散布
	ムギキモグリバエ								
	ムギアカタマバエ								
ヒメビウンカ	8倍	800mL/10a	無人航空機による散布						
ヒメビウンカ									
大麦	アブラムシ類	1000倍	60~150 L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回		
	アワヨトウ					30倍		3L/10a	空中散布
	ムギキモグリバエ								
	ムギアカタマバエ								
ヒメビウンカ	8倍	800mL/10a	無人航空機による散布						
ヒメビウンカ									
大麦	アブラムシ類	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
小麦	アブラムシ類	250倍	25L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
	アブラムシ類 アワヨトウ ムギキモグリバエ	1000倍	60~150 L/10a				
	ムギアカタマバエ ヒメトビウンカ	30倍	3L/10a				
	ヒメトビウンカ	8倍	800mL/10a			無人航空機 による散布	
	アブラムシ類						
みかん	アブラムシ類	1000~2000倍	200~ 700L/10a	収穫14日前 まで	5回以内	散布	5回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	ハマキムシ類 サンホーゼカイガラムシ アザミウマ類 カメムシ類 カネタタキ ミカンツボミタマバエ ケシキスイ類 コアオハナムグリ フラーバラゾウムシ ミカンキジラミ コナカイガラムシ類						
	ケシキスイ類 コアオハナムグリ アザミウマ類	10倍				5L/10a	
だいず	マメシクイガ ダイズサヤタマバエ シロイチマダラメイガ マメヒメサヤムシガ カメムシ類	20倍	3L/10a	収穫21日前 まで	4回以内	空中散布	4回以内
	ダイズサヤタマバエ シロイチマダラメイガ ダイズサヤムシガ カメムシ類 ウコンノメイガ マメシクイガ	8倍	800mL/10a			無人航空機 による散布	
	シロイチマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 マメヒメサヤムシガ ウコンノメイガ	1000倍	100~ 300L/10a			散布	
	マメハンミョウ						
	アブラムシ類	1000~2000倍					
	マメシクイガ	1000~1500倍					
らっきょう	ネダニ類	1000~2000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬	3回以内 (植付前は1 回以内、植 付後は2回 以内)
	アザミウマ類	1000倍	100~ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	