

殺虫殺菌剤

# ハツパ<sup>®</sup>乳剤

なたね油乳剤

使用回数制限のない  
うどんこ病・ハダニの防除剤

安全  
安心



有機農産物生産(JAS)に対応!



サンケイ化学株式会社

# ハツパ<sup>®</sup>乳剤

農林水産省登録 第15837号  
有効成分：なたね油 90.0%  
性状：淡黄色澄明可乳化油状液体  
毒性：普通物  
有効年限：3年  
包装：1ℓ×12

特長

- ★なたね油を有効成分とする安全性の高い薬剤です。
- ★抵抗性や耐性菌発生の少ない物理的防除剤です。
- ★収穫前日まで使用可能で、散布回数制限もありません。
- ★有機栽培農産物生産にも使用可能です。
- ★有効成分はポジティブリスト制度の対象外物質です。

## 適用病害虫名および使用方法

平成22年5月26日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	なたね油を含む農薬の総使用回数
きゅうり	ハダニ類 うどんこ病	200倍	—	—	散布	—
かぼちゃ ズッキーニ	うどんこ病					
ばら	ハダニ類 うどんこ病					

### 上手な使い方

- 本剤は病害虫の体表面に付着することで効果を発揮します。散布液が直接病害虫にかからないと効果が発揮されませんので、病害虫にムラなくかかるよう、葉の表裏へ丁寧に十分散布しましょう。
- 1週間間隔で希釈液を2～3回連用すると効果的です。多発時は散布間隔を短縮することをおすすめします。
- 拡張性の高い薬剤ですので、展着剤を加用する必要がありません。

### ▲ 使用上の注意事項

- 調製した薬液は速やかに散布してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 散布直後の降雨は、本剤の効果を低下させるので、好天の続く時に使用してください。
- ジチアノンの散布後、本剤を散布する場合は10日以上の間隔をあけて散布してください。
- きゅうりに使用する場合は次の注意事項を守ってください。
  - うどんこ病の防除に使用する場合、発病後の散布は効果が劣るので本病の発生前、発生初期から予防的に散布してください。
  - ハダニ類の防除に使用する場合、散布液が直接害虫にかかるよう葉の表裏に丁寧に散布し、多発生時には効果を高めるために7日程度の間隔で連続散布してください。
  - 幼苗期の散布及び過度の連用は薬害を生ずるおそれがあるのでさけてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としとしてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

## 取扱い



# サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11 ☎(03) 3845-7951  
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目 13-1 ☎(048) 551-2122  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4丁目 5-1 ☎(06) 6305-5871