



フェロモン剤 (交信攪乱用)

ビートアーミルア剤

ヨトウコン®-S

農林水産省登録 第17605号

(信越化学工業(株)登録)

性状：淡黄色澄明可乳化油状液体(ポリエチレン細管に封入)

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

消防法：第4類第3石油類

有効年限：1.5年

包装：100m巻×10、(20cm×100体)×50袋

有効成分：(Z,E)-9,12-テトラデカジエニル = アセタート・・・53.0%

(Z)-9-テトラデセン-1-オール・・・24.0%

ヨトウコン®は信越化学工業(株)の登録商標です。

特長

- 本剤はハスモンヨトウの成虫に作用し、交信攪乱効果により成虫の交尾行動を連続的に阻害し、次世代の幼虫密度を抑制する性フェロモン剤です。
- 従来の殺虫剤に感受性の低下したハスモンヨトウにも有効です。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用場所	使用目的	適用病害虫名	本剤の使用量	使用時期	使用方法
シロイチモジヨトウが加害する農作物	シロイチモジヨトウの加害作物栽培地帯	交尾阻害	シロイチモジヨトウ	露地の場合：100～500本 (20cm チューブ) /10a	シロイチモジヨトウの発生初期～終期	作物上に支柱等を用いて固定する。
				露地の場合：100～140本 (20cm チューブの場合 は500～700本) /10a		

使用上の注意事項

- 本剤はシロイチモジヨトウ成虫の交尾行動を連続的に阻害して雌雄の交尾率を低下させることによる密度低下を目的としていますので、シロイチモジヨトウの発生初期から収穫期まで連続的に、広範囲な地域で使用することをおすすめします。
- 本剤の露地での使用量は10アールあたり100～150本を標準としますが、害虫発生量の多い場合、傾斜地で使用する場合等では効果が劣ることがあるので、このような場合は所定の範囲内の多めの量で使用してください。
- ハウス栽培で換気を行なっている場合は所定の範囲内の多めの量で使用してください。
- 開封したまま放置すると薬剤が揮散するので使用直前に開封し、使いきってください。
- 本剤は設置後、2～3ヶ月経つと効果が低下してくるので、3ヶ月後には新しいものと交換してください。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。
- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密封して保管してください。