

殺菌剤

ストレプトマイシン・有機銅水和剤

ドーマイシン[®]水和剤

農林水産省登録 第 11297 号

性状：黄褐色水和性粉末 45 μ m 以下

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効年限：3 年

包装：500g 袋 × 20

有効成分：8-ヒドロキシキノリン銅 (PRTR・1種)・・・40.0%

ストレプトマイシン硫酸塩・・・6.3%

(ストレプトマイシンとして 5.0%)

ドーマイシン[®]はサンケイ化学(株)の登録商標です。

特長

- 保護殺菌作用の強い有機銅と細菌病にすぐれた効果を示すストレプトマイシンを主剤とし、それぞれの特長を生かした製剤で、残効性もあり安定した防除効果を示します。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
こんにゃく	腐敗病 葉枯病	500 倍	収穫 30 日前まで	6 回以内	散布	6 回以内 (種いもへの処理は 1 回以内)	8 回以内
はくさい	軟腐病	600 ~ 1000 倍		3 回以内		3 回以内	
レタス	軟腐病 腐敗病	1000 倍	収穫 30 日前まで	2 回以内		2 回以内	5 回以内
キャベツ	黒腐病		収穫 14 日前まで	3 回以内			
シクラメン	軟腐病	500 倍	—	6 回以内		8 回以内	5 回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布の際はマスク、手袋などをして散布液を吸い込んだり、多量に浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- アルカリ性農薬と混用する場合は散布直前に混ぜてください。
- 散布の際は、葉裏にもよくかかるように散布してください。
- シクラメンの軟腐病に使用する場合、莖葉だけでなく、球根部に対しても十分かかるように散布してください。
- 本剤の使用により、薬害としてクロロシス(黄化現象)を生じることがあります。特に、高温多湿時及び幼苗期には薬害を生やすので留意の上、散布してください。
- はくさいに使用する場合、高温期及び幼苗期の散布はさけてください。
- レタス及びキャベツに使用する場合、高温期の連続散布はさけてください。

安全使用上の注意事項

- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。
また、散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼にはいった場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。
- 付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に関する注意事項

- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。
また空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。