

殺虫剤

エトフェンプロックス粉剤

なげこみトレボン®

農林水産省登録 第 187993 号
(三井化学アグロ㈱登録)
性状：淡黄色透明油状液体水溶性容器入り 1 個 50 ml
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
消防法：第 4 類第 4 石油類
有効年限：4 年
包装：(50 ml水溶性容器 × 6 個入り) × 20

有効成分：エトフェンプロックス (PRTR・1 種) 4.0%

トレボン®は三井化学アグロ㈱の登録商標です。

特長

- 散布機がいらず容器のまま水田に投げ込むので処理は簡単、省力的です。
- 薬剤に直接ふれることがなく、飛散することもないので、安全に処理できます。
- イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ・ヨコバイ類など各種水稲害虫に優れた効果と残効性を発揮します。
- 容器は水溶性ですので、水にぬれると多少ベタつきますが中味はすぐには出てません。処理時の天候に左右されず、雨の日も処理できるので防除適期をのがしません。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10 アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数
稲	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	水溶性容器 4～6 個 (200～300 ml)	移植後 20 日以降 (但し 5 葉期以後) 収穫 21 日前まで	3 回以内	水田に水溶性 容器のまま投 げ入れる	3 回以内
	ウンカ類 ニカメイチュウ第1世代 ツマグロヨコバイ	水溶性容器 10 個 (500 ml)				
	イナゴ類	水溶性容器 4～10 個 (300～500 ml)				
いぐさ	イグサシムシガ	水溶性容器 6 個 (300 ml)	—			

使用上の注意事項

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。
- 水溶性容器を使用しているので濡れた手で作業しないでください。
- 薬効に関する事項
 - 使用に際しては、所定個数を水溶性容器のまま圃場全体に均等に投げ込んでください。
 - 湛水状態で、土壌にめり込ませてよう畦畔から軽く投げ入れてください。
 - 処理後、少なくとも3～4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水をきらせたりしないように注意し、また散布後7日間は落水、かけ流ししないでください。
- 薬害に関する事項
 - 強風下では、薬液が風下に吹き寄せられ薬害を生ずることがあるので、使用をさけてください。
 - 内容液が、稲、いぐさの茎葉に直接付着すると薬害を生ずるので、水溶性容器のまま田水面で投げ込んでください。
 - 藻、ウキクサ等が多数浮遊している水田や稲、いぐさが活着不良または軟弱徒長の場合には薬害を生ずることがあるので、使用をさけてください。
 - 蚕に対して長期間毒性があるので、内容液が絶対に桑葉にかからないようにしてください。
 - 使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などないように注意してください。
- 水溶性容器に封入されているため、使用の際は濡れた手で触らないでください。
- 使用の際は手袋などを着用してください。使用後は手足、顔などを石けんでよく洗ってください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮ふに対して刺激性があるので、付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 密封し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を堅く閉じて保管してください。

水産動植物に関する注意事項

- 水産動植物に影響を及ぼすので養魚田での使用はさけてください。水槽、池、河川などに入らないよう注意してください。甲殻類および冷水魚に特に影響を及ぼすおそれがあるので、養殖池等周辺での使用はさけてください。

畔から ポーンとなげこみトレボン!



散布機が不要ありません！
容器のまま水田に投げ込むので
簡単・便利で省物的ですよ！