

# 展着剤

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル系展着剤

# ベタリン<sup>®</sup>-A

農林水産省登録 第13800号

性状：淡黄色粘稠液体

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

消防法：第4類第2石油類

有効年限：5年

包装：500ml瓶×20

有効成分：ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル・・・・・・・・・・20.0%

（ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル（PRTR・1種）・・・・・・・・14.0%）

（ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル（PRTR・1種）・・・・・・・・6.0%）

ベタリン<sup>®</sup>はサンケイ化学㈱の登録商標です。

## 特長

○非イオン界面活性剤を有効成分とした製剤で主剤の懸垂性・湿展性・付着性を増し物理性を増強して作物や病害虫に対する付着をよくして主剤の効果を増強する補助剤です。

## 適用病害虫名および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液 10ℓ 当り使用量 (希釈倍数)	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、 抗生物質剤、硫黄剤、 銅剤、ボルドー液等の殺菌剤	稲、麦、キャベツ、ねぎ等で 展着しにくい作物	2～4 ml	添加
	果樹、野菜等で 薬剤のつきやすい作物	1～2 ml	
パラコート液剤、ジクワット液剤等の 除草剤	水田作物、畑作物等	5～15 ml	

## 使用上の注意事項

- 使用量に合わせて秤量し、使いきってください。
- 本剤の所定量を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布してください。
- 使用前に瓶を軽く振って均一にしてから使用してください。
- 稲、麦、キャベツ、ねぎなど薬液のつきにくい作物又は雑草に散布する場合には多目に加用し、果樹、そ菜などで薬液のつきやすい作物又は雑草に散布する場合には少なめに加用してください。

## 水産動植物に関する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。