

誘引剤

ケルキボルア剤

カシナガコール[®]

有効成分：ケルキボルア……………78.0%

農林水産省登録 第 23065 号

性状：淡黄色澄明油状液体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

消防法：第 4 類第 3 石油類(非水溶性液体)

有効年限：冷蔵保存(2℃以下)で通年 3 年

包装：(1 ml ボトル × 2 本) × 4 袋

カシナガコール[®]は、サンケイ化学㈱の登録商標です。

特 長

- カシノナガキクイムシによるナラ集団枯損地帯からカシノナガキクイムシを大量誘引できる集合フェロモンです。
- 半径 50m 以内のカシノナガキクイムシの雌雄成虫を誘引します。
- 樹幹注入殺菌剤、伐倒くん蒸剤との併用により、カシノナガキクイムシをおとりの木または丸太に大量に誘引し、防除することができます。
- 成分は 6 週間出続けます。おとり木、おとり丸太法は 1 回の設置で大量に誘引することができます。

適用病害虫名および使用方法

作物名	使用目的	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法
なら類 (生立木)	誘引	カシノナガキクイムシ	8個 / 10a (2個 / 樹)	春季～夏季	本剤を生立木に設置する。
なら類 (伐倒木)			2個 / 集積		本剤を集積した伐倒木に設置する。

使用上の注意事項

- 外装のアルミはく袋を開封したまま放置すると、有効成分が揮散するので、使用直前に開封してください。
- 本剤を設置する場合は、直射日光をさけて、風などで落下しないように設置してください。
- なら類(生立木)に使用する場合は以下の注意事項を守ってください。
 - ① 1 0 a 当り 4 本の健全ななら類を設置対象とし、設置樹は林分の中央部に設定することが望ましい。
 - ② 地上約 1m の樹幹部に、1 樹当り 2 個を左右対称に吊り下げて設置してください。
- なら類(伐倒木)に使用する場合は以下の注意事項を守ってください。
 - ① 健全ななら類を伐倒し、長さ 1～2m、末口 1 0 cm 以上の丸太とし、弁桁組又ははい積にしてください。集積単位は 1～1 0 0 m²程度にしてください。
 - ② 丸太の乾燥を防ぐため、陽光が直接当たらない林道の待避所や、伐採現場の山土場等を集積場所とし、なら類林分内には集積しないでください。また、集積場所がなら類林分より離れすぎると誘引効果が劣ることがあるので注意してください。
 - ③ 誘引効果が均一となるよう集積の両端に吊り下げて設置してください。
- 本剤には殺虫・殺菌効果はないので、カシノナガキクイムシまたはなら類萎凋病に登録のある農薬を使用してください。なお、その場合は各々以下の注意事項および使用上の注意事項を守ってください。
 - ① なら類(生立木)に使用する場合は、誘引されたカシノナガキクイムシの穿入により引き起こされる萎凋病の被害を防ぐため、本剤を設置するなら類及び周囲約 1 0 a 内の健全ななら類に対して萎凋病に有効な殺菌剤を必ず使用してください。
 - ② なら類(伐倒木)に使用する場合は、未被害地へ被害丸太を移動させず、カシノナガキクイムシ次世代成虫脱出前までにカシノナガキクイムシ用のくん蒸剤を使用するか、粉砕等の物理的防除を行ってください。
- 使用済みの容器は林内に捨てないように注意し、必ず使用区域外で処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には林業試験場、林業指導所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所(2℃以下)に密栓して保管してください。