

殺虫剤

BPMC・MEPマイクロカプセル剤

シバラック® MC

有効成分：MEP (PRTR・1種)……………15.0%
BPMC (PRTR・1種)……………10.0%

農林水産省登録 第21312号

性状：淡黄色粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効年限：3年

包装：1ℓ×10

シバラック®は、サンケイ化学㈱の登録商標です。

特長

- MEP と BPMC の作用で幅広い殺虫スペクトラムがあります。
- マイクロカプセル製剤なので、長期残効が期待できます。

適用病害虫名および使用方法

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
芝	ミミズの糞塚形成防止	500倍	1~2ℓ/㎡	糞塚形成時	散布	3回以内	5回以内	6回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
芝	コガネムシ類幼虫 シバオサゾウムシ幼虫	500倍	3ℓ/㎡	発生初期	散布	3回以内	5回以内	6回以内
	シバツトガ スジキリヨトウ	500倍~1000倍	0.3ℓ/㎡					

使用上の注意事項

- 貯蔵中に沈殿を生ずることがあるので、使用直前に容器をよく振って使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 希釈液調製後はできるだけ速やかに使用してください。また希釈液調製後に静置しておいた場合は、散布前に十分攪拌してください。
- 芝のコガネムシ類(幼虫)、シバオサゾウムシ幼虫に使用する場合は、土壤中に十分しみこむようにジョロ等で1㎡当り3ℓ散布してください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意して、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。

安全使用上の注意事項

- BPMCによる中毒に対しては動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。MEPの解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効であると報告されています。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 保管する場合は、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

水産動植物に関する注意事項

- 本剤は水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川養殖池等に飛散流入しないように注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。
散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。