

サンケイ化学 農薬登録情報

ディアナ SC

スピネトラム水和剤

登録番号：農林水産省登録第 22910 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：スピネトラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.7% 殺虫剤分類：5

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ディアナ SC」は令和 6 年 9 月 1 1 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「こまつな」に適用病害虫名「ハクサイダニ」、希釈倍数「2500 倍」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」、「ブロッコリー」、「たまねぎ」および「ねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「にんにく」に適用病害虫名「ネギコガ」を追加する。
- ・作物名「にら（花茎）」に適用病害虫名「ネギコガ」、希釈倍数「2500 倍」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更】

●変更事項

- ・ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないこと。

●追加事項

- ・本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
 - ① 散布は各散布機種別の散布基準に従って実施すること。
 - ② 散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ④ 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ⑤ 散布終了後は次の事項を守ること。
 - 1) 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
 - 2) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- ・無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。
- ・浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL: (099) 268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL: (0985) 25-7051

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スペクトラムを含む農薬の総使用回数		
稲	イネツトムシ コブノメイガ フタオビコヤガ ニカメイチュウ	4000 ～6000倍	60～150ℓ /10a	収穫 7日前まで		散布	3回以内 (直播では種時 又は移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内)		
		32～48倍	0.8ℓ /10a						
こまつな	ハクサイダニ	2500倍	100～300ℓ /10a			散布	2回以内		
	コナガ ハスモンヨトウ アザミウマ類 アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ	2500～ 5000倍							
かんしょ	ヒルガオハモグリガ	2500倍	100～300ℓ /10a			散布	2回以内		
	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2500～ 5000倍							
		32倍						0.8ℓ /10a	
		64倍	1.6ℓ /10a						
ブロッコリー	アザミウマ類 ウワバ類 アオムシ オオタバコガ コナガ シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500～ 5000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後は2回以内)		
		アオムシ コナガ ハスモンヨトウ						48倍	1.6ℓ /10a
		96倍						3.2ℓ /10a	
たまねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2500～ 5000倍	100～300ℓ /10a			散布	2回以内		
		アザミウマ類 ネギハモグリバエ						48倍	1.6ℓ /10a
		96倍						3.2ℓ /10a	
ねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギコガ	2500～ 5000倍	100～300ℓ /10a			散布	2回以内		
		アザミウマ類						48倍	1.6ℓ /10a
								96倍	3.2ℓ /10a
にんにく	アザミウマ類 ネギコガ	2500～ 5000倍	100～300ℓ /10a			散布			
にら(花茎)	アザミウマ類 ネギコガ	2500倍							