

# サンケイ化学 農薬登録情報

## トクチオン乳剤

プロチオホス乳剤

登録番号：農林水産省登録第 13426 号（登録会社：アリスタ ライフサイエンス株式会社）

有効成分：プロチオホス・・・45.0%

殺虫剤分類：1B

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

## 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「トクチオン乳剤」は令和 6 年 11 月 13 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「にんにく」の使用 방법에「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「アブラムシ類」を追加する。
- ・作物名「てんさい」の適用病害虫名「ハダニ類」の希釈倍数「1000～1500 倍」、使用 방법에「無人航空機による散布」を追加する。

### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

### 【使用上の注意事項の変更等】

#### ●変更事項

- ・たまねぎに対して希釈倍数 300 倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の**速度連動式**地上液剤散布装置を使用すること。

#### ●追加事項

- ・本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
  - (1) 散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
  - (2) 散布機種に適合した散布装置を使用すること。
  - (3) 散布中薬液の漏れのないように、機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
  - (4) 散布薬液の飛散によって他の動植物及び諸物件に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

| 作物名  | 適用病害虫名   | 希釈倍数           | 使用液量             | 使用時期         | 本剤の使用回数 | 使用方法           | プロチオホスを含む農薬の総使用回数   |      |
|------|--|----------------|------------------|--------------|---------|----------------|---|------|
| キャベツ | コナガ<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ<br>アオムシ<br>ウワバ類<br>アブラムシ類<br>シロイチモジヨトウ | 1000倍          | 100～300ℓ<br>/10a | 収穫21日前<br>まで | 2回以内    | 散布             | 2回以内  |      |
| ねぎ   | アザミウマ類<br>シロイチモジヨトウ<br>ネギコガ<br>ネギハモグリバエ                        | 16倍            | 1.6ℓ/10a         | 収穫7日前<br>まで  | 3回以内    | 無人航空機<br>による散布 | 4回以内<br>(定植時の<br>土壌混和は1回以内、<br>散布、無人航空機散布<br>及び株元灌注は<br>合計3回以内) |      |
|      | アザミウマ類<br>シロイチモジヨトウ<br>ネギコガ<br>ネギハモグリバエ                        |                |                  |              |         |                |   |      |
|      | ネダニ類<br>クロバネキノコバエ類   | 2000倍          | 3ℓ/㎡             | 株元灌注         |         |                |   |      |
| にんにく | ネギコガ<br>チュウリップサビダニ<br>アザミウマ類                                   | 1000倍          | 100～300ℓ<br>/10a | 収穫14日前<br>まで | 1回      | 散布             | 4回以内<br>(種球浸漬は<br>1回以内、<br>散布及び<br>無人航空機散布は<br>合計3回以内)          |      |
|      | ネギコガ<br>チュウリップサビダニ<br>アザミウマ類                                   | 16倍            | 1.6ℓ/10a         |              |         |                |   |      |
|      | チュウリップサビダニ   | —              | —                | 植付前          |         | 120分間<br>種球浸漬  |   |      |
| いちご  | ハダニ類<br>キンケクチプトゾウムシ成虫<br>アブラムシ類                                | 1000倍          | 100～300ℓ<br>/10a | 収穫75日前<br>まで | 3回以内    | 散布             | 3回以内<br>(仮植床植付時の<br>土壌混和は1回以内)                                  |      |
| てんさい | ヨトウムシ<br>カメノコハムシ<br>アブラムシ類<br>ハダニ類                             | 1000<br>～1500倍 |                  | 収穫30日前<br>まで | 2回以内    |                | 無人航空機<br>による散布  | 2回以内 |
|      | テンサイモグリハナバエ<br>テンサイトビハムシ                                       | 1000倍          |                  |              |         |                |   |      |
|      | ヨトウムシ<br>カメノコハムシ<br>アブラムシ類<br>ハダニ類<br>テンサイモグリハナバエ<br>テンサイトビハムシ | 16倍            | 1.6ℓ/10a         |              |         |                |   |      |